

Důležité zásady homeopatické 1. pomoci

Napsal uživatel vilcakul
Úterý, 30 Březen 2010 15:47 -

Podání homeopatického léku je jednoduché a jeho účinek je rychlý, musíme však přitom dbát na správné dávkování a způsob podání homeopatického léku. Užívání homeopatických léků bez výběru může více uškodit než pomoci, obzvlášť při vysokých potencích. Najednou podáváme jenom jeden lék a jen tolik dávek, než se zmírní bolest a pak musíme lék vysadit. Dodržujeme termíny předepsaného užití léku v příslušné dávce.

Pro zjednodušení a abychom předešli nedorozumění, doporučujeme tyto potence: C 6, C 30, C 200. Je známo vícero potencí, ale tyto tři potence pokryjí hlavní indikace všech následujících případů, kde je budeme používat podle doporučení.

Podle toho podáme lék v potenci C 200 jednou, maximálně dvakrát; lék v potenci C 30 můžeme podat vícekrát: 3 až 9x; v akutních případech každou 4 až 6 hodinu, v méně akutních případech jen 2 až 3x. Lék v potenci C 6 můžeme podávat delší dobu.

Hlavní zásadou je to, že jakmile ustoupí bolest, hned musíme vysadit podávání léku. Nedodržení této zásady může vést k objevení se příznaků, které jsou charakteristické pro užívaný homeopatický lék a mohou zhoršit stav pacienta!

Doporučené potence homeopatických léků můžeme užít buď v granulích, globulkách, kapkách nebo tabletě. Odsypeme si potřebné množství z lékovky do kalíšku a dáme pod jazyk rozpustit v ústech. Doporučuje se před a po užití homeopatického léku aspoň ¼ hodiny nejíst a nepít.

Následující případy jsou dobře zvládnutelné homeopatickou terapií, ale samozřejmě tyto předpisy nenahrazují chirurgické a lékařské ošetření v indikovaných případech. Homeopatie však napomůže rychlejší rekonvalescenci a zabrání trvalým následkům a umožní rychlejší lékařské ošetření.

Na vnější obklady postižených částí těla se používá roztoků z mateřské tinktury dotyčné rostliny ve vodě, můžeme nakapat 5 až 10 kapek tinktury do čtvrti litru vody a v tom namáčet obklad.

Úrazy

Pohmožděniný – hned podáme homeopatikum *Arnica montana* C 200, po půl hodině *Arnica* C 30 v závislosti na charakteru poranění, 2 - 3x denně. Tím zmírníte bolesti a napomůžete návratu tělesných tekutin do tkání a zkrátí se i čas rekonvalescence. Můžeme zkusit i zevně obklad z *Arnica montana*, ale je třeba dodržet určitou opatrnost a nenechávat roztok dlouho na pokožce.

V tom případě, když se modřina neztrácí a obzvlášť, když je poraněná část těla studená a necitlivá, tak je třeba užít *Ledum palustre* C 6, 3x denně.

Řezné rány – při povrchové ráně dáváme obklad z rostliny *Hypericum perforatum* nebo *Calendula officinalis*. Při bolestivosti rány postačí několik dávek *Staphysagria* C 30 nebo *Calendula officinalis* C 30.

Tržné rány – 1 až 2 dávky *Arnica montana* C 200, obklad *Hypericum perforatum*. Při poranění nervů podáváme 3x denně *Hypericum perforatum* C 6, obzvlášť při silné bolestivosti. Když je bolest nesnesitelná, můžeme podávat *Hypericum perforatum* C 30 každou hodinu do úlevy. Rekonvalescence se urychlí podáváním *Arnica montana* C 6 2x denně podle potřeby.

Bodné rány – tu je doporučena speciální homeopatická terapie, která se skládá z užívání homeopatika *Ledum palustre* C 30, 3x denně po dobu 2 až 3 dní, pak podáváme *Hypericum perforatum* C 6, obzvlášť při vyzařování bolesti do končetiny. Při celkovém vychladnutí a necitlivosti těla nebo naopak při přecitlivělosti na dotek a úlevě studenými obklady a chladem, podáváme *Ledum palustre* C 6, 3x denně.

Odřeniný – obklad *Calendula officinalis* a nebo *Hypericum perforatum*, můžeme tyto dva prostředky smíchat.

Zlomeniný – v každém případě podáme 1 až 2 dávky *Arnica montana* C 200, poté několik dní podáme *Arnica* C 30 nebo *Ledum palustre* C 30. V následujících 1 až 2 týdnech podáváme *Symphytum officinale* C 6 na urychlení tvorby kalusu.

Popáleniný – často jsou doprovázeny šokem, co nejdříve podat 1 dávku *Arnica montana* C 200, při velkém úleku 1 dávku *Aconitum napellus* C 200, na zmírnění bolesti podáváme každých 10 minut *Cantharis* C 30 do zlepšení. Vhodný je i obklad popáleniny roztokem *Hypericum*

perfoliatum nebo z *Urticy urens*, kterou můžeme podávat střídavě s *Cantharisem vesicatoria* C 30 v potenci C 30, na úlevu od bolesti.

Omrzliny – zevně obklad roztokem *Hyperica perfoliata* nebo oleje, vnitřně několik dní užívat 2x denně *Lachesis mutus* C 30, v případě pocitu páchaní dáváme několik dní *Apis mellifica* C 30.

Poranění hlavy – hned po úrazu i v případě ztráty vědomí podáváme každou půlhodinu, 5 až 6x *Arnica montana* C 30. V případě příznaků vnitřní iritace lebky: ztuhlosti krčních svalů, rozšířených pupil, křečí svalů a zmatenosti postiženého je indikovaná *Cicuta virosa* C 30, 3x denně do zlepšení stavu pacienta. Jestliže se bolest hlavy projeví v zátylku s pocitem těžkých víček a třesem končetin doporučuje se *Gelsemium* C 30. Při trvalých následcích po úrazu hlavy je nejúčinnějším lékem *Natrum sulphuricum* C 30, který je indikován při otřesu mozku.

Vymknutí, natažení vazů – hned po úrazu podáme *Arnica montana* C 30, 5 až 6x každou hodinu, potom můžeme podat 2 až 3x *Rhus toxicodendron* C 6 do zlepšení stavu pacienta. V případě poranění okostice volíme *Ruta graveolens* C 6, při opuchnutí kloubu a zhoršení sebemenším pohybem je indikovaná *Bryonia alba* C 30, 3x denně do ústupu edému. Poté pokračujeme v léčbě lékem *Rhus toxicodendron* C 6. Jestliže je postižená část těla studená a necitlivá, ale zlepšuje se studenými obklady a naopak zhoršuje teplem, tak předepisujeme *Ledum palustre* C 6. Při poranění svalstva je nejlepším prostředkem *Arnica montana* C 6, může být i obklad na postiženou část končetiny. Opakované vymknutí kotníků si budou vyžadovat léky *Rhus toxicodendron* C 6 a *Ruta graveolens* C 6, vedle dalších opatření.

Poranění páteře – po pádu z výšky může vést k trvalým následkům a proto co nejdříve podáme jednu až dvě dávky *Arnica montana* C 200, potom několik dní na to 3x denně *Hypericum perfoliatum* C 30. Samozřejmě v těžších případech musíme pacienta převést do nemocnice na rentgen a zajistit mu chirurgické ošetření v případě potřeby.

Pokousání, uštípnutí hmyzem – nejpoužívanějším lékem je *Ledum palustre*, ve vážnějších případech v potenci C 200, jinak podáváme potenci C 30. V případě přetrvávání potíží (otok, bolestivost) můžeme dlouhodobě podávat *Ledum palustre* C 6. Při uštípnutí včelou u pacienta se silnou alergickou reakcí podejme *Carbolicum acidum* C 30 každou ½ - 1 hodinu.

Při pálivé bolesti a rychle rostoucím otoku, zrudnutí postiženého místa a pálení indikuje lék *Apis mellifica* C 30 nebo *Cantharis vesicatoria* C 30; při zmodrání postiženého místa a pálení podejte *Tarentula cubensis* C 30. *Ledum palustre* bude vhodné v případech, kdy je postižené místo studené a necitlivé nebo citlivé na dotek a zlepšuje se chladem. Při vystřelující bolesti a šíření se podél nervových drah podejte *Hypericum perfoliatum* C 30 nebo C 6.

Důležité zásady homeopatické 1. pomoci

Napsal uživatel vilcakul
Úterý, 30 Březen 2010 15:47 -

Na obklady postiženého místa můžeme použít tyto mateřské tinktury:

uštípnutí včelou – *Ledum palustre* nebo *Urtica urens*

uštípnutí vosou – *Arnica montana* nebo *Ledum palustre*

uštípnutí komárem – *Calendula officinalis* nebo *Hypericum perforatum*

uštípnutí hadem – *Hypericum perforatum*

Pokousání vzteklým psem indikuje podání léku *Belladonna C 30* po dobu jednoho týdne, jedenkrát denně a potom po dobu šesti týdnů, 1x týdně. Podobně můžeme v prevenci použít i lék *Lyssinum C 30*.

Při uštknutí silně jedovatým hmyzem nebo hadem se doporučují následující léky:

Carbolicum acidum C 30 – pacient je omámen, ztmavělý obličej, bledost okolo úst.

Crotalus horridus C 6 – rychlý vývoj toxických symptomů, barevné změny otoků a tmavá krvácivost po těle.

Echinacea C 6 – infekce nebo gangréna částí těla, zapáchající výměšky.

Lachesis mutus C 30 – postižená část těla zmodrá a objeví se tmavé krvácení.

Oxalicum acidum C 30 – postižená část těla je studená, necitlivá, popelavě zbarvená, prudké bolesti a nástup třesu.

Při poranění rybou jed účinně neutralizuje *Kalium permanganatum*, v ředěné formě ho aplikujeme do rány, vnitřně už dříve vzpomínané léky. Při uštknutí medusou aplikujeme *Apis mellifica C 30* nebo *Medusa C 30*.

Důležité zásady homeopatické 1. pomoci

Napsal uživatel vilcakul
Úterý, 30 Březen 2010 15:47 -

Chirurgické ošetření, zubař – při poranění tkáně, krvácení a otoku podáme Arnica montana C 30, na snížení strachu u dětí můžeme podat Aconitum napellus C 30, po něm se uklidní! Po vytržení zubu můžeme vyplachovat ústa roztokem Calendula officinalis, v případě velké bolesti můžeme namísto Arnicy podat Hypericum perforatum C 30.

Poranění oka – obklad oka roztokem Hypericum perforatum, vnitřně Arnica montana C 200. V případě velké bolesti každou hodinu podáme Hypericum perforatum C 6, dokud bolest neustoupí. Podobný efekt dosáhneme podáním Aconitum napellus C 30 několik dávek.

Při bolesti oční koule můžeme podat Symphytum officinale C 6, Phytolacca americana C 6 nebo Colocynthis C 6. Při přetrvávající bolesti doporučujeme Arnica montana C 30 2x denně, po několik dní. Jestliže se do oka dostal cizí předmět, musíme ho vypláchnout roztokem z Hyperica perforata, po odstranění předmětu a pocitu bolestivosti můžeme vyplachovat roztokem Euphrasia officinalis a vnitřně užívat lék v potenci C6. Při zakrvácení oka užíváme Arnica montana C 30 každou hodinu, 5 až 6x. Při zlepšení otoku studenými obklady podáme Ledum palustre C 30, dále užíváme Arnica montana C 6 nebo při bolesti Hypericum perforatum C 6. Můžeme použít na obklad i roztok Calendula officinalis, který napomáhá hojení a snižuje bolestivost.

Zdroj: Dr. D. M. Gibson: Homeopatická první pomoc

překlad © 2008 vilcakul